ANNEXES

Effet	Tests Univariés de Significativité pour RSA% 30mn (Feuille d Paramétrisation sigma-restreinte Décomposition de l'hypothèse efficace SC	Degr. de Liberté	MC	F	p
ord. origine	392620,4	1	392620,4	33653,21	0,000000
genotype	1228,8	1	1228,8	105,33	0,000000
Dilutions	272,5	4	68,1	5,84	0,002784
genotype*Dilutions	98,5	4	24,6	2,11	0,117171
Erreur	233,3	20	11,7		

Tableau 5 :Variation du % d'inhibition en fonction des dilutions

Cellule N°	Test HSD de Tukey ; variable RSA% 30mn (Feuille de données1 Groupes Homogènes, alpha = ,05000 Erreur : MC Inter = 11,667, dl = 20,000 genotype	RSA% 30mn Moyen.	1	2
1	1	108,000	****	0,00
2	2	120,800		0,00

Tableau 6 :Variations de l' « RSA » après 30mn de l'effet génotype

Cellule N°	Test HSD de Tukey ; variable RSA% 30mn (Feuille de données1) Groupes Homogènes, alpha = ,05000 Erreur : MC Inter = 11,667, dl = 20,000 Dilutions	RSA% 30mn Moyen.	1	2
1	1	109,500	****	
2	2	112,500	****	****
3	3	115,500		****
5	5	116,833		****
4	4	117,666		****

Tableau7 : L'effet des dilutions de laurier noble et de la menthe poivrée sur le « RSA »



Figure 13 : Extraction des huiles essentielles par l'hydrodistillateur



Figure 14 :La détermination du pouvoir antioxydant par spectrophotomètre