Tableau	Titre	Page
Tableau 1	Abondances relatives des espèces de Culicidae récoltées au niveau de la région de Tébessa (juin 2006 à mai 2007) (Bouabida et *al*., 2012).	6
Tableau 2	Position systématique de *Culiseta longiareolata* (Paul, 2009).	7
Tableau 3	Position systématique du romarin**.**	18
Tableau 4	Principales classes de composés phénoliques (Merghem , 2010).	24
Tableau 5	Effet des composés phénoliques de *Rosmarinus officinalis* (mg/ml) sur le taux (%) de mortalité chez les larves du premier stade (L_1) exuviées de *Cs. Longiareolata* (m ± écart-moyen, n = 3 répétitions comportant chacune 25 individus).	34
Tableau 6	Effet des composés phénoliques de *Rosmarinus officinalis* (mg/ml) sur le taux (%) de mortalité chez les larves du premier stade (L_1) exuviées de *Cs. longiareolata*. Analyse de la variance des données.	34
Tableau 7	Efficacité des composés phénoliques de *Rosmarinus officinalis* sur des larves du premier stade nouvellement exuviées de *Cs. longiareolata*, Analyse des probits.	35
Tableau 8	Effet des composés phénoliques de *Rosmarinus officinalis* (mg/ml) sur le taux (%) de mortalité chez les larves du deuxième stade (L_2) exuviées de *Cs. longiareolata* (m ± écart-moyen, n = 3 répétitions comportant chacune 25 individus).	35
Tableau 9	Effet des composés phénoliques de *Rosmarinus officinalis* (mg/ml) sur le taux (%) de mortalité chez les larves du premier stade (L_1) exuviées de *Cs.*	36

	longiareolata. Analyse de la variance des données.	
Tableau 10	Efficacité des composés phénoliques de *Rosmarinus officinalis* sur des larves du deuxième stade nouvellement exuviées de *Cs. longiareolata*, Analyse des probits.	36