Conclusion

Cette étude a été menée pour faire un inventaire de la flore dans quatre stations dans la région de Morsott (wilaya de Tébessa).représentant différentes formations steppiques.

Les résultats obtenus suite à cette étude, ont permis de conclure que les sites d'étude renferment 40 espèces reparties entre 17 familles. La famille la plus dominante est celle des Astéracées qui renferme 8 espèces, suivie par la famille des Fabaceae qui renferme 5 espèces, et les familles des ; Lamiacées, Brassicacées, et Amaranthacées avec 4 espèces, puis les Poacées avec 3 espèces et les Cistacées avec 2 espèces.

Les autres familles s'illustrent d'une manière moins marquante par rapport aux familles précédentes (Pinacées, Smilacacées, Liliacées, Oléacées, Boraginacées, Orobanchacées, Zygophyllacées, Anacardiacées, Globulariacées, Rasedacées*)*.

Il s'est avéré aussi que la station B « El torchene », qui renferme 28 espèces, est plus diversifiée par rapport aux autres stations.

Au terme de cette étude nous pouvons dire que la flore steppique dans la région de Morsott, (wilaya de Tébessa) est assez variée.

Comme perspectives pour ce travail il serait souhaitable d'inventorier de nouvelles espaces dans le but de rencontrer et d'identifier de nouvelles espèces et d'allonger la période d'étude, car cette zone n'a pas encore bénéficié d'un travail important pour donner des résultats fiables et exploitables.