Références bibliographiques

A

ABERLIN et DAGET, (2003). Etablir et comparer les spectres biologiques de plusieurs groupements végétaux. Revue d'élevage et de médecine vétérinaire tropicales.

AIDOUD A, (1989**).** Contribution à l'étude des écosystèmes pâturés des hautes plaines Algéro-oranaises (Algérie) : fonctionnement, évaluation et évolution des ressources végétales.

AIDOUD A, (1994). Les changements climatiques dans les espaces steppiques. Causes et implication pastorale. Act. Coll. Stratégie de mise en oeuvre du développement pastoral.

ANAT, (2004). « Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire », Carte bioclimatique de l'algérie.

ANDI, (2015). « Agence Nationale de Développement de l'Investissement ».

AUBERT, 1980. L'écosystème steppique: quel avenir?

B

Bayer E., Buttler K.P., Finkenzeller X. & Grau J. (1990). Guide de la Flore Méditerranéenne. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris, pp : 1-287.

BELALA.F et HIRCHE.A, (2013), Changements climatiques : tendance et variabilité pluviométrique dans quelques stations steppiques algériennes.

BENABADJI N., BENMANSOUR, D., BOUAZZA, M, (2007). La flore des monts d'Ain Fezza dans l'ouest Algerien, Biodiversité et dynamique, Université Abou Beker Belkaid-Tlemcen

BENABADJI. N, (2012). Contribution à une étude phytoécologique et phytoédaphique des Thero-Brachypodietea dans la région de Tlemcen. Mémoire de Magister en agronomie, Université Abou Baker Belkaid- Tlemcen.

BENDERRADJI M, ALATOU D, AZZEDINE M, ARFA T, BENACHOUR K (2006). Problèmes de dégradation de l'environnement par la désertification et la déforestation: impact du phénomène en Algérie New Medit.

BENHAMICHE S et MOULAI R, (2012). Analyse des phytocénoses des systèmes insulaires des régions de Béjayaet de Jijel (Algerie) en présence du Goéland Leuciphée (Larus michahellis) Revue (Terre vie).

BENMAHMOUD-KHATTABI A, (2012). Espaces sub-arides 40ans de gestion traditionnelle et projets de développement (analyse de 1970 à 2010) cas de la wilaya de Tébessa. Mémoire de Magister, université Mentouri de Constantine.

Blanca G., Cabezudo B., Cueto M., Fernández López C., & Morales Torres C. (2009). Flora vascular de Andalucía oriental : Tome 1. pp : 1-427.

Blanca G., Cabezudo B., Cueto M., Fernández López C., & Morales Torres C. (2009). Flora vascular de Andalucía oriental : Tome 2. pp : 1-492.

Blanca G., Cabezudo B., Cueto M., Fernández López C., & Morales Torres C. (2009). Flora vascular de Andalucía oriental : Tome 3. pp : 1-460.

Blanca G., Cabezudo B., Cueto M., Fernández López C., & Morales Torres C. (2009). Flora vascular de Andalucía oriental : Tome 4. pp : 1-426.

BONNET V, VIDAL E, MEDAIL F,et TATONI t (1999). Analyse diachronique des changements floristiques sur un archipel méditerranéen périurbain.revue.ecologie (terre et vie).

BOUCIF H, (2014). Contribution à l'étude de la productivité des parcours steppiques de la région sud de la wilaya de Tlemcen.

BOULKEDDID T, (2014). L'utilisation des ressources productives dans l'agriculture algerienne « evolution et Perspectives».

BOUZENOUNE.A, (2013).les écosystèmes steppiques et sahariens.

C

CIHEAM. Montpellier Série B : Etudes et recherches n° 10.

COTTERILL, (1995). Systematics, biological knowledge and environmental conservation. Biodiversity and Conservation.

D

DAGET P (1980)**.** Sur les types biologiques botaniques en tant que stratégie adaptative (cas des thérophytes)**.** In **:** recherches d'écologie théorique : les stratégies adaptatives (ed BARBAULT R. BLANDINI P et MEYER J.A). Maloine. Paris.

DELLOUL.F, (2014). Inventaire des plantes médicinales et étude du sol dans la route de Rass El Oyoun.

DJELLAB M et ZEMMALI S. (2015). Etude comparative de la flore médicinale et de la nature du sol dans deux pinèdes de la région de Tébessa.

DJELLOULI Y (1990). Flores et climats en Algérie septentrionale. Déterminismes climatiques de la répartition des plantes. Thèse Doctorat. Sciences, USTHB., Alger, 210.

F

FLORETl C ; GALAN M J ; LEFLOCH E ; ORSHAN G et ROMANE F (1981), Dynamique des systèmes écologiques de la zone aride (application à l'aménagement sur des bases écologiques d'une zone de la Tunisie pré-saharienne).

FOX J. Getting started with the R commander, (2005): a basic-statistics graphical user interface to R. J Stat Softw 14:1–42.

G

GRUBB, P.J, (1977).The maintenance of species-richness in plant communities: the importance of the regeneration niche. Biological Reviews.

GUENDOUZI L, (2014). Contribution à l'étude de la phytomasse aérienne d'écosystèmes steppique de la commune de Maâmora (Saida).

H

HAMADA S ; DAKKI M ; RABIOUH et FENNANE M., (2004). Analyse de la biodiversité des zones humides du Maroc. Flore rare, menacée et halophile.

J

JAUFFERT S, (2001). Validation et comparaison de divers indicateurs des changements à long terme dans les écosystèmes méditerranéens : application au suivi de la désertification dans le sud Tunisien, Thèse de Doctorat. Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix- Marseille, France.

L

LARBI A, (2014). L'offre de soins dans les différentes régions d'Algérie.

LE HOUEROUH N, (1995). Considération biogéographique sur les steppes arides du nord de l'Afrique in sécheresse.

LE HOUEROU H.N (1992). An overiew of vegetation and land degradation in world arid lands. In: H.E. Dregne (ed). Degradation and restoration of arid lands. International centre for arid and semi-aride land studies, Texas technical University, Lubbok.

M

MEKAHLIA M.N, (2014) Dépendance mycorhyzienne de l'olivier (Olea europaea L) dans l'est algerien et mycorhyzation contrôlée de la variété ferkeni Thèse Doctorat, université Badji Mokhtar (Annaba).

MOUHOUS A, (2005). Les causes de la dégradation des parcours steppiques.

MOULAY A (2013). Contribution à l'étude de la régénération naturelle et artificielle de *Stipa tenacissima* L. dans la région steppique occidentale(Algérie). these de doctorat en sciences biologiques, Université de Mascara.

MRABET H ; (2003). Dictionnaire de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Edition RERTT. Paris.

N

NEDJIMI B et GUIT B, (2012). Les steppes algériennes « causes de déséquilibre »

NEDJIMI.B et HOMIDA M, (2006). Problématique des zones steppiques Algériennes et Perspectives d'avenir.

NEDJRAOUI D, (2002). Evaluation des ressources pastorales des régions steppiques algériennes et définition des indicateurs de dégradation. Unité de Recherche sur les Ressources Biologiques Terrestres.

NEDJRAOUI D et BEDRANI S, (2008). La désertification dans les steppes algériennes : causes, impacts et actions de lutte.

O

OZENDA P (1977). Flore du sahara. 2éme éd. CNRS. Paris. Pp : 1-622.

OZENDA P, (1983). Flore du Sahara. 2e édition. Ed. CNRS, Paris.

P

PYŠEK P, RICHARDSON D.M, PERGL J, JAROŠÍK V, SIXTOVÁ Z et WEBER E, (2008). Geographical and taxonomic biases in invasion ecology. Trends in Ecology & Evolution.

Q

QUEZEL P. et SANTA S, (1962). Nouvelle flore de l'Algérie et des régions désertiques méridionales. Tome I, pp : 1-565.

QUEZEL P. et SANTA S, (1962). Nouvelle flore de l'Algérie et des régions désertiques méridionales. Tome I, pp : 571-1170.

QUEZEL P. et SANTA S, (1963). Nouvelle flore de l'Algérie et des régions désertiques méridionales. Tome II. Ed. CNRS, Paris.

QUEZEL P, (1978). Analysis of the flora Mediterranean and Saharan Africa. Annals of the Missouri Botanical Garden.

Quézel P ; Barbero M ; Benabid A ; Loisel R et Rivas-Martinez S, (1992)**.** Contribution à la connaissance des matorrals du Maroc oriental. Phytocoenologia ; 21 : 117-74.

R

RAHMOUNE C, MAALEM S. ET BENNACEUR M (2001). Effets comparés de la fertilisation phosphatée sur l'Atriplex cultivé en zone semi-aride du Nord-est algérien.

RAUNKIAER C, 1934 The life forms of plants and statistical plant, geography Clarendon Press, Oxford.

S

SOLTANI N, (2011). Etude des caractéristiques morphologiques de la race ovine dans la région de Tébessa.

SARR M (2008). Variabilité pluviométrique Afrique de l'ouest : dynamique des espaces végétaux a partir des images satellitales.

U

UNESCO, (1963) bioclimatique map of the mediterranean region, Scale 1 :5,000,000. Prepared by Emberger et al. And established by bagnouls, drawn by Rinaldo. Ed UNESCOFAO.

V

Valdes B., Talavera S. & Fernandez-Galiano E. (1987). Flora vascular de Andalucia Occidental: Tome 1. Barcelona: Ketres Editora , pp : 1-485.

Valdes B., Talavera S. & Fernandez-Galiano E. (1987). Flora vascular de Andalucia Occidental: Tome 2. Barcelona: Ketres Editora , pp : 1-640.

W

WEZEL (2004). Foreign bank entry into emerging economies

Wilkinson G, Rogers C (1973). Symbolic descriptions of factorial models for analysis of variance. *Appl Statistics.*