REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

-A-

-Abbott, W. B. 1925. A method for computing the effectiveness of an insecticide. *J. Econ. Entomol*., 18 : 265 -267.

-Adda C., Borgemeister C., Biliwa A. &Meikle W.G., 2002. Integrated pest management in post-harvest maize: a case study from the Republic of Togo (West Africa).

Adeoti R.O.,Coulibaly C.,&Tamo M., 2002-facteurs affectant adoption des nouvelles technologies du niébé Vignaunguiculta en afrique de l'ouest. Bulletin de recherché Argonomique du Bénin (N°36);18p.

-Afes K., 1998. Essai de micropagation in vitro de l'Aganier (*Argania spinosa* (L) SKEELS) culture de microboutures à partir de plantes en plein champ et à partir de graines germées (hypocotyles, cotydon, bourgeon apical). Mémoire d'ingénieur d'état en agronomie. Université de MOSTAGANEM.60 p.

-Afssa., 2002. Rapport relatif à l'équivalence en substance de l'huile d'argan (*Arganiaspinosa* L. Skeels) avec d'autres huiles alimentaires conformément à l'article 5 du règlement CE 258/97 relatif aux nouveaux aliments et nouveaux ingrédients.8 p.

-Ahmed K.S., Itino T. & Ichikawa T. 1999:Effects of plant oils on oviposition preference and larval survivorship of *Callosobruchuschinensis*(Coleoptera: Bruchidae) on azuki bean. *Applied Entomology and Zoology,* **34**(4): 547-550.

-Amalia Kartika., 2005. Nouveau procédé de fractionnement des graines de tournesol : expression et extraction en extrudeur bi vis, purification par ultrafiltration de l'huile de tournesol, Thèse doctorat de l'Institut National Polytechnique de Toulouse, France.

-B-

- Benhalima H., Chaudhry M.Q., Mills K.A. & Price N.R., 2004. Phosphine resistance in stored-product insects collected from various grain storage facilities in Morocco. *J. Stored Prod. Res.*, 40, 241-249.

-Balachowsky A.S., 1962. Traité d'entomologie appliquée à l'agriculture. Tom. 01, vol ; 01. Ed. Masson et Cie, *Paris* ; pp 374-392.

-Balachowsky, A.S., 1963. Entomologie Appliquée à L'agriculture, les Coléoptères. Ed. Masson et Cie, T.1, p 314-315.

Bamaiyi L.J., Ndams I.S., Toro W.A. &OdekinaS. 2006:Effect of mahogany *Khaysenegalensis*seed oil in the control of *Callosobruchusmaculatus*on stored cowpea. *Plant Protection Science*, 42 **(**4): 130-134

-Baricevic D., Sosa S., Della L.R., Tubaro A., Simonovska B., Krasna A., Zupancic A., 2001. Topical anti-inflammatory activity of *Salvia officinalis* L.Leaves: the relevance of ursolic acid. *Journal of Ethnopharmacology*.75 :125–132.

-Barkat M., Laib I., 2011. Composition chimique et activité antioxydante de l'huile essentielle des fleurs sèches de *Lavandulaofficinalis*. Revue de génie industriel ; 6 : 46-54.

-Belache P., 1979. Traité de phytothérapie et d'aromathérapie. Tome 1 : l'aromatogramme .éd. Maloine.Paris.Benayache S., Benaissa O., Amrani A., Bicha S., Zama D.

-Benayache F.,Marchioni E., 2013. Free radical scavenging action of phenolic compounds from LimoniumBonueli (Plumbaginaceae). 2013. *Scholars Research Library DerPharmacia Lettre*. 5(5):234-240.

-Benkhellat O., 2002. Contribution à l'étude des conditions de manutention du blé et de l'écologie des arthropodes dans les écosystèmes de stockage de la région de Bejaia et essai de lutte contre *rhyzoperthadominica*(Coleoptera:bostichidae) à base de poudre de plantes. Thèse. mag. Science de la nature. Univ. Bejaia.102p.

-Bennick A., 2002. Interaction of plant polyphenols with salivary proteins. Crit. Rev. Oral Biol. Med. 13 (2): 184-196.

-Binbenet, J. J., A. Duquenoy, et al. 1993. Génie des procédés alimentairesdes bases aux applications. Paris.

-Bouchet N., Lévesque J., Pousset J-L., 2000. HPLC isolation, identification and quantification of tannins from *Guierasenegalensis*. Phytochem. Anal. 11: 52-56.

-Braüchler C., Meimberg H., Heubl G., 2010. Molecular phylogeny of Menthinae (Lamiaceae, Nepetoideae, Mentheae).Taxonomy, biogeography and conflicts. MolecularPhylogenetics and Evolution. 55 : 501-523

-Bruneton J., 1993. Pharmacognosie et phytochimie. Plantes médicinales. Paris, France.

-Bruneton J., 1999. Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales. Techniques et Documentation. 3ème éd. Lavoisier. Paris (France). 199 p.

-C-

-Cisowski, W. 1985. "Flavonoidcompound in Myrrhisodorata (L.) Scop." Herba Polonica, 31: 13-19.

-Champ (B. R) Ct Genn (B. G.). 1971 - Some mutants of stored-products Coleoptera. .j. stored prod. Res. 7: 293-298.

-Champ (B. R) Ct Dyte(C. E.). 1976- Rapport de l'enquête mondiale de la FAO sur les insectes des céréales entreposées et leur sensibilité aux insecticides.FAO.Rome..374 p.

-Chanegriha N., Foudil-cherif Y., Baaliouamer A., Meklati B.Y., 1998, RivistaItaliana. E.P.P.O., 2511-16.

-CharroufZ., 200b. L'huile d'argan, une prodigieuse vitalité néenau du desert. Espérance Médicale. Octobre 2002. Tone 9N)87, 1-9.

-Cheftel J. C., Cheftel H., 1984. Introduction à la biochimie et à la technologie des aliments. Techniques & documentation- Lavoisier : Vol 1 : 244-249.

-Chella R &Azegagh N, 2004- Utilisation de l'extraitacétonique des feuilles de figuier « Ficus Craca » : Moracées,Phanyrogammae contre *Rhyzoperthadominica*(Coléoptère : Bostrichidae).ing .Univ .A M.Bejaia. Pp 44.

-ChimiH., 2005. Conservations compares de l'huile d'rgan et de l'huile d'olive. Cahiers Agricultures vol. 14, n) 5n September-octobre.457-471.

-Clareton Nadine 1999 La lavande. *Lavandula angustifolia* Mill. Thése pour le diplôme d'état de docteur en pharmacie. Montpellier.

-Codex Alimentarius,1992 Fats, Oils and related products, Vol 8,

-Cogburn(R. R.). Burkiiolder(W. E.) etWiliams(H. J.) .1984 - Field tests With the aggregation pheromone' of the lesser grain borer. Environ. Entomol. 13. 162-1 GG.

-Collingborn, F.M.B., Gowen, S.R. ET Mueller-Harvey, I. 2000. Investigations into the biochemical basis for nematode resistance in roots of three Musa cultivars in response to Radopholussimilis infection. J. Agric. Food Chem. p48, 5297-5301.

-Couplan F., 2012, Lettre d'information n°12, Rencontre avec la lavande.

-D-

-Dahmani S. 2013, Utilisation des Extraits du café, du thé et la farine du caroubier pourl'obtention des nanopaticules de divers métaux.. Mémoire du Master .Université Abou BekrBelkaidTlemcen.

-Davies J.R. 2000.Hawthorn element books limited..

-De Cliff S. et Harerimana P.C., 2013. Extraction de l'huile essentielle complète des fleurs de Canangaodorata de la plaine de l'Imbo : vers la vulgarisation d'une nouvelle filière de plantes industrielles au Burundi. Revue de l'université de Burundi, Série Sciences Exactes V : 28 : 1-17.

-Delille L, 2007. Les plantes médicinales d‟Algérie. Édition BERTI. Alger, 122

-Delobelet Tran, 1993. Les Coléoptères des denrées entreposées dans les régions chauds. EdOrstom.pp 125-129.

-Dibert K. 1989. Contribution à l'étude de l'extraction solide-liquide de l'huile et de l'acide chlorogénique du café vert. LYON, Claude Bernard LYON I.

Doumma A., Salissou O., Sembene M., Sidikou R.S.D., Sanon A.,Ketoh G.K. &Glitho I.A. 2011 :Etude de l'activité reproductrice de *Callosobruchusmaculatus*(Coleoptera :Bruchidae) sur dix variétés de niébé, *Vignaunguiculata*(L.) Walp., en présence ou non de son parasitoide, *Dinarmusbasalis*R. (Hymenoptera: Pteromalidae). *Journal of Animal and Plant Sciences,* **11:** 1398-1408.

-Dupont F,Guignard J-L 2007 : Botanique, systématique moléculaire.ISSY-Les Moulineaux : Masson, 285 pages.

-Duraffourd C., D'Hervicourt L. et Laparaz J.C. 1990 –Cahiers de phytothérapie clinique. 1. Examens de laboratoires galénique. Eléments thérapeutiques synergiques.2éme éd. Masson, Paris.

-E-

-Effendi L., Yajun Y. et al.2008. Functional expression of a P450 flavonoid hydroxylase for the biosynthesis of plant-specific hydroxylatedflavonols in Escherichia coli .Metab.Eng.8: 172-181.

-El Halfawy(M. A.) et Hassan (H. I.). 1978 - The relative susceptibility of certain varieties of wheat, maize and barley to infestation with the lesser grain borer. *Rhizoperthadominica F*. Agric. Res. Reo. 56 : 165-169

-Elharas K., Daagare A., Mesfioui A., Ouhssine M. 2013- Activité antibactérienne d'huile essentielle des inflorescences de Laurusnobilis et Lavandula angustifolia. Afrique Science ;

-Eymard S., 2003. Mise en évidence et suivi de l'oxydation des lipides au cours de la conservation et de la transformation du chinchard (Trachurus trachurus) : choix des procédés. These Doctorat, Université de Nantes, France,277.

-F-

-Fabiani Gilbert,Christof Alain 2002Memoires de la lavande Barbentane : équinoxe, 131 pages.

-Fabre B., Fort-Lacoste L. et Charveron M., 1998. L'intérêt de l'huile d'argan vierge et enrichie en insaponifiable ansi que les peptides extrait de trourteaux en cosmétologie.In : Colloque International sur les ressources végétales « l'Arganier et les plantes des zones arides et semi-arides » Agadir 23-25 avril.

-Fabricius, Johan Christian consulté le 30 mars 2015, dans *An accentuatedlist of the British Lepidoptera, withhints on the derivation of the names*, EntomologicalSocieties of Oxford and Cambridge, 1858, p. XVI — Cet article laisse largement la parole à Fabricius lui-même, dans une autobiographie écrite en 1804 ou 1805.

-Fantino N.S, 1990, Etude du polymorphisme au d'une population de lavande (*Lavandulaangustifolia Mill.*)- Détermination de critères précoces de sélection, Thèse de doctorat.Université de La Rochelle, p : 41-45.

-Feucht, W., Treutter, D. et Christ, E. 1997. Role of flavanols in yellowing beech trees of the Black forest. TreePhysiol. p17, 335-340.

-Flaurat-Lessard D. 1982. Les insectes et les acariens. In. MULTON JL., conservation etstockages des grains et graines et produits dérivées. Ed .Lavoisier, Paris. Vol.01 ; pp 394-436.

-Foua-Bik, 1989. Vulgarisation de la méthode du triple ensachage pour le stockage amélioré du niébé en zonesahélienne du nord Cameroun : Enjeux et perceptions paysannes. *Tropicultura,* 31 (3): 170-178.

.

-Franchomme , P. et D. Pénoël., 2001 L'aromathérapie exactement. Editions Roger Jollois ; Limoges ;.

-Franchomme P., Jollois R., Penoel D., 2007, L'aromathérapie exactement : Encyclopédie de l'utilisation thérapeutique des extraits aromatiques. 1e éd. Paris: Roger Jollois, 490 pages.

-G-

-Gao, L. and G. Mazza 1996. "Extraction of anthocyanin pigments from purple sunflower hulls." J. Food sci. 61: 600-603.

-Garnero J. 1996 ,Huiles essentielles. Dossier : 345.. Base documentaire : Constantes physico-chimiques. Vol.papier n° :K2.

-Ghestem A. , Seguin E., Paris M.et Orecchioni A.M 2001 – Le préparateur en pharmacie. Dossier 2, - Botanique, Pharmacognosie,Phytothérapie,Homéopthie.Ed.TEC et DOC, Paris.

-Guignard J. L. 2000. Biochimie végétale. 2ème édition. Edition Dunod, Paris, pp 198-207.

-H-

-Haddouchi F, Lazouni HA, Meziane A, Benmansour A 2009. Etude physicochimique et microbiologique de l'huile essentielle de Thymus fontanesiiBoiss&Reut. Afrique SCIENCE 05(2):246 - 259.

-HagstrumD.W.,Phillips T.W.,&Cuperus G.,2012.Stored Product Protection.K-StateResearch and Extension.Kensas,358pp

-Hamidi A.2012 Etude phytochimique et activité biologique de la plante *Limoniastrumguyonianum*.. Mémoire de Magistère. Université KasdiMerbah Ouargla.

-HalalI M., Charrouf Z., Soulhi A., Soulhi A., Hachimi L .et Guillaume D.,2005. Influence of origin and extraction method on argan oil physico-chemical chareristics and composition. J.Agric Food Chem, N°53,2081-2087.

-Haubruge E., et Amichot M. 1998. Les mécanismes responsables de la résistance aux insecticides chez les insectes et les acariens, Biotechnol. Agron. Soc. Environ.2 :161–174.

-HilaliM., 2001. Contribution à valorisation de l'arganie : Etude des caractéristiques physico-chimiques de l'huile d'argan en fonction de son mode d'extraction et étude comparative des fruits de l'arganier en fonction de leurs formes et de leurs régions DESA.Faculté des Sciences.Université Mohammed V. Maroc. 96 p.

-Hilan C., Sfeir R., Jawish D. &Aitour S., 2006. Huiles essentielles de certaines plantes médicinales libanaises de la famille des Lamiceae. Lebanaise Science Journal. Vol.7 (2) : 13-22

-I-

-Iserin P., 2001. Larousse Encyclopédie des plantes médicinales. Ed Larousse, pp10, 335.

-J-

-J. Bruneton, 2009.Pharmacogonosie, phytochimie, plantes médicinales, Paris ;Cachan : Ed. Tec & doc ; Ed. médicales internationales.

-Jean-Blain, C. 1998. Aspects nutritionnels et toxicologiques des tanins. Rev.Méd. Vét. p149, 911 920.

-Judd Walter S, Campbell Christopher S, Kellogg Elizabeth A, Stevens Peter, 2002. Botanique Systématique, une perspective phylogénétique. Edition De Boeck Université ,84-87 ,396-399.

-K-

-Kalish D.2014, Expressionphytochimique des plantes (cas Fabaceae) face aux stressécologiques. Thème de Licence. Universityd'Ouargla.

-Kaloma A., Kitambala K., Ndjango N.L.,Sinzahera U. et Paluku T. 2008.Effet des produdres d'ucalyptus citriodora, de Cupressus lucitancica et Tagetas minitiflora dans la conservation du mais (Zea mays) et (Phaseolus vulgaris) dans ls condition de Rethy (République démocratiquedu Cango). Tropicultura26(1) :24-27.

-Karleskind A., 1992 Manuel des corps gras Tome II, Ed. Tec et doc. Paris,1992,P1-1565.

-Khalfi-HabesOuassila, 2007- Evaluation du potentiel biocide et étude de l'influence de lacomposition des huiles essentielles de quelques plantes algériennes sur *Rhyzopertha dominica*
(F) (Coleoptera : Bostrichidae) et *Callosobruchusmaculatus*(F) (Coleoptera:Bostrychidae).
Thèse de doctorat, Institue nationale agronomique-el Harrach. Alger. Pp119.

-Khalifi-Habes Khalifi-Habes O., Boutekedjiret C. et Sellami S., 2008. Activité biologique de trois huiles essentielles extraites de plantes algériennes sur Rhyzopertha domminica (F) (Colcoptera : Bostrychidae). Br. 5707. 6p.

-Kothe H.W., 2007, 1000 plantes aromatiques et médicinales, Terres Edition.

-K. Elharas, A. Daagare, A. Mesfioui et M. Ouhssine 2010). « Activité antibactérienne de l'huile essentielle des inflorescences de *Laurusnobilis* et *Lavandulaangustifolia* ». Afrique Science, Vol. 9(2), ISSN 1813-548X.

-Keïta S.M. et al. 2000. Effect of various essential oils on *Callosobruchusmaculatus* (F.) (Coleoptera: Bruchidae). *J. Stored Prod. Res*., 36, 355-364.

Kellouche A. &SoltaniN. 2004 :Activité biologique des poudres de cinq plantes et de l'huile essentielle d'une d'entre elles sur *Callosobruchusmaculatus. International Journal of Tropical Insect Science,* **24:** 184-191.

-KelloucheA.,Ait-Aider F., Labdaoui K., Moula D., Ouendi K., Hamadi N., Ouramdane A., Frerot B. &MelloukM. 2010:Biological activity of tenessential oils against cowpea beetle, *Callosobruchusmaculatus*(Coleoptera: Bruchidae).*International Journal of Integrative Biology***, 10(2):** 86-93.

-Kubeczka, K.H., Bartsch, A. et Ullmann, I. 1982. "Recent studies on essential oils of Apiaceae." AetherischeOele, Ergeb. Int. Arbeitstag.: 158-187.

Kulišic T., Dragovic-Uzelac V., Miloš M. 2006. Antioxidant activity of aqueous tea infusions prepared from oregano, thyme and wild thyme. Food Technology and. Biotechnology. 44, 485-492.

Kumar R. 1991 :La lutte contre les insectes ravageurs. *Edition Karthala et CTA* ,France et Pays-as, 293p.

-L-

-Labeyrie V., 1992. Problèmes fondamentaux posés par les insectes des denrées. *In* Foua-Bi K. &Philogène B.J.R., éds. Actes du seminaire international à Abidjan, Côte d'Ivoire, 29 janvier-1 février 1992, 9-14.

-Landbo, A.-K. R. and A. B. S. Meyer 2001. Enzymatic enhancement and oxidant activities of anthocyanins and other phenolic compounds in black currant juice. Biologically active phytochemicals in food. Cambridge UK, Royal Society of Chemistry: 354-356.

-Leinmüller, E.,Steingass, H. and Menke, K.H. 1991. Tannins in Ruminant feedstuff.-LESNE (P.), 1941 - Quelques remarques sur *le Rhizoperthadominico* F_ Reu. fr.Entomol. 7 :145-151.

-Leybros, J. and P. Frémeaux 1990. "Extraction solide-liquide aspects théoriques." techniques de l'ingénieur, traité Génie des procédés J1 077 06.

-Luicitla, R. Lgunez ; 2006, Etude de l'extraction de métabolites secondaires de différentes matières végétales en réacteur chauffé par induction thermomagnétique directe, Thèse de l'Institut National Polytechnique de Toulouse, France.

-Luque-Garcia, J. L. and M. D. 2003. Luque de Castro. "Ultrasound: A powerful tool for leaching." Trends in Analytical Chemistry 22: 41-47.

-M-

-Mafart, P. and E. Béliard 1993. Génie Industriel Alimentaire techniques séparatives. Paris, Techniques et Documentation-Lavoisier.

-Maffei&Sacco, 1997, Perfumer and flavorist, Flavour and Fragrance Journal.13, p.61.

-Mahroof, R., Zhu, K.Y., Neven, L., Subramanyam, B., Bai, J.F., 2010. Expression patterns of three heat shock protein 70 genes among developmental stages of the red flour beetle, Triboliumcastaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). Comp. Biochem. Physiol. A. Mol. Integr. Physiol. 141, 247–256. Morris, K., Lorenzen, M.D., Hiromasa, Y., Tom

-Maiza, A., Kilani-Morakchi, S., Farine, J.P., Smagghe, G., Aribi, N. &Soltani, N. 2004. Hormone analogue methoprene and carbamatebenfuracarb. *Comm. Biol. Ghent University*., 69/3. 257.

-Marzoukia H., Elaissib A., Khaldic A., Bouzidd S., Falconierie D., Marongin B., PirasaA.andporcedda S.,2009, seasonal and geographical variation of laurusnobilis.-Meunier Christiane Lavandes et Lanvandins.Aix-en-Provence : Edisud. 214 pages

-Mourier A. 1979. Animaux et insectes hots cachés de nos maisons .EdDelachaux et Niestlé.

-Mohammad Mounir, S. 2007. Département Génie des procédés Industriels. La Rochelle, Université de La Rochelle.

-Mueller-Harvey, I. et Mc Allan, A.B. 1992. Tannins: their biochemistry and nutritional properties. Adv. Plant Cell Biochem. Biotechnol. p1, 151-217.

-M. M. Cowan,1999. « Plant products as antimicrobial agrnts », Clin. Microbiol.Rev., vol. 12 n°4,p 564-582.

-MullinC.A.&ScottJ.G.,1992.Biomolecularbasis forinsecticideresistance:classification and comparisons. In: IshaayaI (Eds.), molecular mechanism of insecticide resistance.*Springer-Verlag, Berlin, Germany*. 1-13.

-N-

-Nakahara K.,Alzoreky N.S., Yoshihashi T., Nguyen H.T., 2003, Japan AgricRes.Quarterly, 37(4), 249-252.

-O-

-Olle M. and Bender I., 2010, the content of oils in Umbelliferons crops and its formation, Agronomy Research 8 (3), p.687-696.

-P-

-Paris M. et Hurabielle M.1981– Abrégé de matiére médicale (pharmacogosie)
Tome. Ed. Masson p.339.

-P. Morin, H. Richard; 1985, Thermal degradation of lineally acetate during steam distillation in Proc. 4 FhWeurmanFlav, Res. Symp. Elsevier Sci. Publ. B.V. Amsterdam, pp 563-576-PotterC., 1935.The biology and distribution of *Rhezoperthadominica* (Fab.). *Transactions of the Royal Entomology Society of London.*83:449-482.

.-R-

-RahmaniM., 1989. Contribution à la croissance de l'huile d'argan. Mémoire de 3 éme cycle. Institue agronomique et vétérinaire, Rabat.38 p.

-Rakotonanahary, M. 2012. Thèse présentée pour l'obtention du titre de docteur en pharmacie diplôme d'état, université Joseph Fourier. p16, 19, 27, 28.

-Regnault-Roger C., 2002. De nouveaux phyto-insecticides pour le troisième millénaire ? *In:* Philogène B.J.R, Regnault-Roger C. & Vincent C., coord. *Biopesticidesd'origine végétale*. Paris : Lavoisier-Éditions Tec & Doc, 19-39.

-Regnault-Roger C.,PhilogèneBJ R., VincentC. 2002.Biopesticidesd'origine Végétale. EdTECetDOC.*Paris,France.*

-Relinger.B ,Don-Pedro K.N. 1988: Insecticidal Activity of Fatty Acid Constituents of Fixed Vegetable Oils against *Callosobruchusmaculatus*on Cowpea. *Pesticide Science,* 30: 295-302

-S-

-Saadatian M., Aghaei M., Sarahpour M. etBalouchi Z., 2013, Global Journal of Medicinal Plant Research, 1(2) "Chemical composition of lavender (Lavandulaofficialis L.) Extraction extracted by twosolvent concentrations", p. 214-217.

-Salle J.L., 1987, Les huiles essentielles : Sythese d'aromatherapie et introduction à la Sympathicothérapie, Ed. Frison Roche, Paris.

-Salle J.L. et Pelletier J. 1991 – Les huiles essentielles, synthése d'aromathérapie et introduction à lasympathicothérapie. Ed. Frison-Roche, pp.19-45.

-SigautF. 1978. Les réserves des grains à long terme. Technique de conservation et fabrication sociales dans l'histoire. Ed. Maison de science de l'homme. Univ.de Till III.35pp.

-Small E. et Deutsch G., 2001, Herbes culinaires pour nos jardins de pays froid, Ed. CNRC

-Schauenberg P. et Paris F., 2010, Guide des plantes médicinale : Analyse, description et utilisation de 400 plantes, Ed. Delachaux et Niestlé, p.396.

-SeckD. 1994 - Développement de méthodes alternatives de contrôle des principaux insectes ravageurs des denrées emmagasinées au Sénégal par l'utilisation de plantes indigènes. Thèse de Doctorat, Fac. Des Sciences agronomiques de Gembloux, 192 p.

-Seyoum A., Asres K., and El-Fiky F.K., 2006. StructureŔ radical scavenging activity relationships of flavonoids. Phytochemistry. 67: 2058Ŕ2070.

-ShaayaE.,Kostjukovski, M.,EILBERGJ., SUKPRAKANC.1997Plantoils asfumigants andcontactinsecticides forthecontrolofstored-productinsects.JournalofStoredProductsResearch33, 7-15.

-Sidi Boulenoir K. et Ziane A., 2003 Etude phytochimique des huiles essentielles de lavandulastoechas L.de la region de Telemcen. Mémoire pour l'obtention du diplôme d'etudes supérieur en biologie.Option : Biochimie.Faculté des Science Université Abou BekrBelkaid-Telemcen.p. 54

-Silano V .and Delbo M., 2008. Assessment report on Foeniculumvulgare Miller. EMEA, European Mecines Agency. London.p. 23.

-Stamoulis K. &Zezza A. 2003: A Conceptual Framework for National Agricultural, Rural Development, and Food Security Strategies and Policies. *ESA Working Paper,* No. 03-17: Agricultural and Development Economics Division, FAO, Rome.

-T-

-Taskova R., Mitova M., Evstatieva L., Ancev M., Peev D., Handjieva N., Bankova V., Popov S.1997. Iridoids, flavonoids and terpenoids as taxonomic markers in Lamiaceae, Scrophulariaceae and Rubiaceae. Bocconea. 5, 631-636.

-Thomson V.1966. The biology of the lesser grain borer Rhizoperthadominica (Fab). Bull. Grain. Tec., 4, 4, 163-168.

-V-

-Valnet J., 1984, Aromathérapie, Traitement des Maladies par des Plantes, MaloineS.A.Editeur Paris.

-Vialard N., 2008, Remèdes et recettes à la lavande, Ed. Rustica.

-Verma RS., Rahman L., Chanotiya CS., Verma RK., Chauhan A., Yadav A., Singh A., Yadav -Vigneron, M. 1954. Fractionnements par solvants. Paris, VIGOT Frères.

-W-

-Weckberker G. & Cory J.G., 1988. Ribonucleotidereductase activity abdgrouth of glutathione-depleted mouse leukemial 1210 cells *in vitro*. *Cancer lettres*. 40: 257-264.

-Weidner.H. 1980 - Der Getreidekapaziner. *Rhyzopertha*dominica (Fabricius. 1792). Prak1. Schadlirogsbek .32: 62-67.

-Wright (V. F.). Fleming (E. E.) Cipost(D.), 1990 - Survival of *Rhyzopertha dominica*on fruits and seeds collected from woodrat; l1 nests in Kansas. j. Kanas entomol. Soc. 63 : 344- 347 développement possible sur fruits de Celtisoccidentalis. Quercus muehlenbergii. Symphoricarpusorbiculatus provenant de nids du rongeur *Neotoma*floridana au Kanasas.

-Womeni H.M., 2004, Identification et analyse des opérations critiques de préparation des fruits, des graines et amande du karité (*Butirospermumparkii*(G. Don) kostschy) : étude de leur influence sur le beurre de karité.

-Woodward, A. et Coppock, D.L. 1995. Role of plant defense in the utilization of native browse in southern Ethiopia. Agroforestry Systems 32 (2), 147-161.

-Z-

-Zuoxin L.,Jouxina G.,etJiujiang Y.,2006 – Aflatoxins in stored mize and rize grains in Liaoning Province, China. Journal of Stored Product. Research vol 42 :468-479.